

**アドエアエアゾール、オルベスコインヘラー、キューパールエアゾール、サルタノールインヘラー
フルティフォームエアゾール**

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
準備 <初回のみ>	ボンベをよく振り、4回空噴霧することができる					
	フルティフォームの場合はフルプッシュを装着する					
吸入前	吸入口のキャップをはずすことができる					
	ボンベをよく振ることができる					
	ボンベを逆さにして水平に正しく構えることができる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる					
	息を吸い始めると同時にボンベの底を強く押して、ゆっくり深く吸入することができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくり息を吐くことができる					
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
保管	清潔に保つことができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.03.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

**アドエアエアゾール、オルベスコインヘラー、キューパールエアゾール、サルタノールインヘラー
フルティフォームエアゾール**

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
準備 <初回のみ>	ボンベをよく振り、4回空噴霧することができる					
	フルティフォームの場合はフルプッシュを装着する					
吸入前	吸入口のキャップをはずすことができる					
	ボンベをよく振ることができる					
	ボンベを逆さにして水平に正しく構えることができる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口を軽く歯でくわえて、しっかり唇でおおうことができる					
	息を吸い始めると同時にボンベの底強くを押して、ゆっくり深く吸入することができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくり息を吐くことができる					
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
保管	清潔に保つことができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.03.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします