

### アノーロエリプタ・レルベアエリプタ・エンクラッセエリプタ

| 吸入チェック項目             |  | チェック欄：○△×で評価し記入して下さい |   |   |   |   |
|----------------------|--|----------------------|---|---|---|---|
|                      |  | /                    | / | / | / | / |
| 吸入前                  | カバーを「カチッ」という音がするまで開くことができる             |                      |   |   |   |   |
| 吸入                   | 苦しならない程度に息を吐き出すことができる<br>※吸入口に息を吹き込まない |                      |   |   |   |   |
|                      | 吸入口を軽くくわえることができる                       |                      |   |   |   |   |
|                      | 強く深く「スーッ」と吸入することができる                   |                      |   |   |   |   |
|                      | 吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる            |                      |   |   |   |   |
|                      | ゆっくりと息を吐くことができる                        |                      |   |   |   |   |
| 吸入後                  | カバーを閉じることができる                          |                      |   |   |   |   |
|                      | うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）                 |                      |   |   |   |   |
| その他                  | 残量の確認をすることができる                         |                      |   |   |   |   |
| 確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン |  |                      |   |   |   |   |

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.08.01

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

### アノーロエリプタ・レルベアエリプタ・エンクラッセエリプタ

| 吸入チェック項目             |  | チェック欄：○△×で評価し記入して下さい |   |   |   |   |
|----------------------|--|----------------------|---|---|---|---|
|                      |  | /                    | / | / | / | / |
| 吸入前                  | カバーを「カチッ」という音がするまで開くことができる             |                      |   |   |   |   |
| 吸入                   | 苦しならない程度に息を吐き出すことができる<br>※吸入口に息を吹き込まない |                      |   |   |   |   |
|                      | 吸入口を軽くくわえることができる                       |                      |   |   |   |   |
|                      | 強く深く「スーッ」と吸入することができる                   |                      |   |   |   |   |
|                      | 吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる            |                      |   |   |   |   |
|                      | ゆっくりと息を吐くことができる                        |                      |   |   |   |   |
| 吸入後                  | カバーを閉じることができる                          |                      |   |   |   |   |
|                      | うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）                 |                      |   |   |   |   |
| その他                  | 残量の確認をすることができる                         |                      |   |   |   |   |
| 確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン |  |                      |   |   |   |   |

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.08.01

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします