

アズマネックスツイストヘラー

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
吸入前	垂直に持ち白いキャップを左に回し、キャップをはずすことができる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口をくわえ、薬を強く、深く吸い込むことができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくり息を吐くことができる					
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
保管	吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.08.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします

アズマネックスツイストヘラー

吸入チェック項目		チェック欄：○△×で評価し記入して下さい				
		/	/	/	/	/
吸入前	垂直に持ち白いキャップを左に回し、キャップをはずすことができる					
吸入	苦しならない程度に息を吐き出すことができる ※吸入口に息を吹き込まない					
	吸入口をくわえ、薬を強く、深く吸い込むことができる					
	吸入口から口を離し、口を閉じて5秒程度の息止めができる					
	ゆっくり息を吐くことができる					
吸入後	うがいができる（ブクブク、ガラガラを各2回）					
保管	吸入口が汚れた時は、乾いた布などで拭くことができる					
その他	残量の確認をすることができる					
確認者（ 医師・看護師・薬剤師 ）サイン						

※次回外来時にお持ちください

リスト改訂日2017.08.01.

※さいたま赤十字病院呼吸器内科で作成したチェックリストです。メーカー説明書とは異なる場合があります

※調剤薬局の方へ

このチェックリストを患者さんが持参した際、お薬手帳に貼付し、与薬時にチェックしていただくようお願いいたします