

診療科
血液内科

疾患名
非ホジキンリンパ腫

レジメ名
CHOP (CHFP)

投与間隔
1コース 3~4週間 計6~8コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | | 投与日 | | | | | |
|----------|-----------|-----|----------------------------|-------------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
| | | | | | 外来 | 入院 | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | |
| エンドキサン | シクロホスファミド | CPA | 750mg/m ² /day | div | 90分 | 120分 | ● | | | | | |
| ドキシソルビシン | ドキシソルビシン | ADM | 50mg/m ² /day | div | 15分 | 30分 | ● | | | | | |
| オンコビン | ビンクリスチン | VCR | 1. 4mg/m ² /day | iv or div | 5分 | 15分 | ● | | | | | |
| (フィルデシン) | | | (2mg/m ² /day) | (iv or div) | (5分) | (15分) | (●) | | | | | |
| プレドニゾン | プレドニゾン | PSL | 100mg/body/day | po | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

備考

21-28日間を1コースとする。
 VCRは最大2mg/dayとする。
 神経障害の副作用軽減のため、オンコビンをフィルデシン(2mg/m²/day)に変更する場合がある。

枝分かれレジメがある:
 001-1: 外来レジメ、001-2: 入院レジメ、001-3: フィルデシン使用の外来レジメ、001-4: フィルデシン使用の入院レジメ

day1にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日
2004年 3月 18日

登録No.
No. 001