

診療科
血液内科

疾患名
非ホジキンリンパ腫

レジメ名
R-CHOP (R-CHFP)

投与間隔
1コース 3~4週間 計6~8コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間		投与日					
					外来	入院	day1	day2	day3	day4	day5	
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m ² /day	div	90分	120分	●					
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	50mg/m ² /day	div	15分	30分	●					
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m ² /day	iv or div	5分	15分	●					
(フィルデシン)			(2mg/m ² /day)	(iv or div)	(5分)	(15分)	(●)					
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	100mg/body/day	po			●	●	●	●	●	
リツキシマブ	リツキシマブ		375mg/m ² /day	div			●		(●)			

備考

VCRは最大2mg/dayとする。
 リツキシマブはday1かday3のいずれかに投与する。
 神経障害の副作用軽減のため、オンコビンをフィルデシン(2mg/m²/day)に変更する場合がある。

枝分かれレジメがある
 002-1: 外来レジメ、002-2: 入院レジメ、002-3: 分割入院レジメ、002-4: 分割外来レジメ
 002-5: フィルデシン使用外来レジメ、002-6: フィルデシン使用入院レジメ、
 002-7: フィルデシン使用分割外来レジメ、002-8: フィルデシン使用分割入院レジメ

アセトアミノフェンは300mgで内服、外来R-CHOPのポララミンは内服、入院R-CHOPのポララミンは点滴で使用。

day1にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日
2004年 3月 18日

登録No.
No. 002