

診療科
血液内科

疾患名
非ホジキンリンパ腫

レジメ名
CMEP

投与間隔
1コース 28日間 計 6コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1	day2	day3	day4	day5
カルボプラチン	カルボプラチン		300mg/m ² /day	div	2~3hr	●				
ノバントロン	ミトキサントロン	MIT	8mg/m ² /day	div	30min	●				
エトポシド	エトポシド	ETP	100mg/m ² /day	po	分3	●	●	●	●	●
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	40mg/m ² /day	po		●	●	●	●	●
(リツキシマブ)	(リツキシマブ)		(375mg/m ² /day)	(div)		(●)				

備考

ETPおよびプレドニゾンは経口投与
リツキサンは生食10倍量に希釈し投与する。投与速度は25mL/hrで開始。1hr後に100mL/hrにUP。2hr後に200mL/hrにUP。
リツキサンの副作用軽減のため、投与前にアセトアミノフェン0.5gを服用およびポララミン1A+生食100mLをdiv。

枝分かれレジメがある
004-1: CMEP療法、004-2: CMEP療法+リツキサン療法(リツキサンを上記にも追加)

登録年月日
2004年 3月 18日

登録No.
No. 004