

診療科  
血液内科

疾患名  
急性前骨髄球性白血病

レジメ名  
JALSG・AML92 寛解導入療法(M3)

投与間隔  
1コース 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
						day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7		
ベサノイド	トレチノイン	ATRA	45mg/m <sup>2</sup> /day	po	分3	CRまで連日経口投与する。								
開始時白血病細胞数が3000/μ L以上														
ダウノマイシン	ダウノルビシン	DNR	40mg/m <sup>2</sup> /day	div	30min	●	●	●						
サンラビン	エノシタビン	BHAC	200mg/m <sup>2</sup> /day	div	3hr	●	●	●	●	●				
ATRA投与中に白血病細胞数が1000/μ L以上の場合														
ダウノマイシン	ダウノルビシン	DNR	40mg/m <sup>2</sup> /day	div	30min	●	●	●						
サンラビン	エノシタビン	BHAC	200mg/m <sup>2</sup> /day	div	3hr	●	●	●	●	●				
さらにATRAを継続し白血病細胞数が1000/μ L以上の場合は再度														
ダウノマイシン	ダウノルビシン	DNR	40mg/m <sup>2</sup> /day	div	30min	●	●	●						
サンラビン	エノシタビン	BHAC	200mg/m <sup>2</sup> /day	div	3hr	●	●	●	●	●				
以上で寛解に到達しない場合														
ダウノマイシン	ダウノルビシン	DNR	50mg/m <sup>2</sup> /day	div	30min	●	●	●	●	●	(●)	(●)		
サンラビン	エノシタビン	BHAC	200mg/m <sup>2</sup> /day	div	3hr	●	●	●	●	●	(●)	(●)		

備考

登録年月日  
2004年 3月 18日

登録No.  
No. 014