

診療科  
血液内科

疾患名  
急性白血病

レジメ名  
Ara-C大量療法

投与間隔  
1コース 6~9日間 計 1クール

| 商品名                          | 一般名      | 略号    | 投与量                       | 投与方法 | 投与時間 | 投与日  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|----------|-------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                              |          |       |                           |      |      | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day6 | day7 | day8 | day9 |
| シタラビン                        | シタラビン    | Ara-C | 2g/m <sup>2</sup> × 2/day | div  | 12hr | ●    | ●    | ●    | ●    | (●)  | (●)  |      |      |      |
| シタラビン投与終了日の後、下記のどちらかを2~3日間投与 |          |       |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ダウノマイシン                      | ダウノルビシン  | DNR   | 20mg/m <sup>2</sup> /day  |      |      |      |      |      |      |      |      | (●)  | (●)  | (●)  |
| or                           |          |       |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ノバントロン                       | ミトキサントロン | MIT   | 7mg/m <sup>2</sup> /day   |      |      |      |      |      |      |      |      | (●)  | (●)  | (●)  |
|                              |          |       |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                              |          |       |                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

備考  
Ara-Cは4日~6日間投与  
DNRおよびMITは、どちらかをAra-C投与終了日の後、2日~3日間投与  
Ara-Cは輸液ポンプで正確に3時間かけて点滴  
角膜炎予防のためステロイド点眼を施行

登録年月日  
2004年 3月 18日

登録No.  
No. 019