

診療科  
血液内科

疾患名  
急性リンパ性白血病

レジメ名  
ModifiedL17(L17M) 寛解導入療法

投与間隔  
1クール

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日																														
						week 1							week 2		week 3					week 4		week 5			week 6											
						1	2	3	4	5	6	7	8	—	15	16	17	18	19	—	22	—	29	—	34	—	36									
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.5~2.0mg/m <sup>2</sup> /day	iv or div		●										●	●																			
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	600~1000mg/m <sup>2</sup> /day	div		(●)																														
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	600mg/m <sup>2</sup> /day	div																																●
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	20mg/m <sup>2</sup> /day	div																			●	●	●											
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	30mg/m <sup>2</sup> /day	div																																●
メトトレキサート	メトトレキサート	MTX	6mg/m <sup>2</sup> /day	it				●		●																										●
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	60mg/body/day	po																																

備考  
PSLは36日まで連日投与。以後tapering。

登録年月日  
2004年 3月 18日

登録No.  
No. 020