診療科	疾患名
血液内科	急性リンパ性白血病

レジメ名	投与間隔
ModifiedL17（L17M） 地固め療法	1コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日 week	1						2	3	4				5			6			7				8	9		
						day	1	2	3	4	5	—			—	25	26	27	28	29	—	—	40	41	42	43	44	45	—		60	—
ダウノマイシン	ダウノルビシン	DNR	60mg／㎡／day	div			●	●	●																						
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	1200mg／㎡／day	div																										●	
キロサイド	シタラビン	Ara-C	25mg／㎡／day	div			●																								
キロサイド	シタラビン	Ara-C	200mg／㎡／day	civ			●	●	●	●	●					●	●	●	●												
ロイケリン	メルカプトプリン	6-MP	100mg／㎡／day	po	分2		●	●	●	●	●																				
メソトレキセート	メトトレキサート	MTX	15mg／㎡／day	div												●	●	●	●	●											
メソトレキセート	メトトレキサート	MTX	6mg／㎡／day	it			●	●								●															
ロイナーゼ	L－アスパラギナーゼ	L-Asp	20000U／㎡／day	div																		●	●	●	●	●	●				

備　　考
寛解導入療法から5日間あけて地固め療法を施行

登録年月日	登録No.
2004 年　　3月 18日	No.　021