

診療科
血液内科

疾患名
急性リンパ性白血病

レジメ名
ModifiedL17(L17M) 維持療法

投与間隔
1コース22週間 36ヶ月継続

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日																					
						week																					
						day	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	4	5	6	7	8	9	10	11		
1st sequence																											
オンコピン	ビンクリスチン	VCR	2mg/m ² /day	iv or div			●																				
ドキソビシン	ドキソビシン	ADM	20mg/m ² /day	div										●	●	●											
ロイケリン	メルカプトプリン	6-MP	90mg/m ² /day	po														●	~ 毎日 ~			●					
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	15mg/m ² /day	po															●	●	●	●					
コスメゲン	アクチマイシンD	ACD	1000μg/m ² /day	div																		●					
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	90mg/m ² /day	po	分2	12hr毎	●	●	●	●	●	●	●														
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	6mg/m ² /day	it														●	●								

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	week																					
						day																					
						78	79	80	81	82	83	84	85	92	99	106	107	17	18	19	20	21	22				
2nd sequence																											
オンコピン	ビンクリスチン	VCR	2mg/m ² /day	iv or div			●																				
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	800mg/m ² /day	div																							
ニドラン	ニムスチン	ACNU	35mg/m ² /day	div																							
ロイケリン	メルカプトプリン	6-MP	90mg/m ² /day	po															●	~ 毎日 ~		●					
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	15mg/m ² /day	po															●	●	●	●					
コスメゲン	アクチマイシンD	ACD	1000μg/m ² /day	div																		●					
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	90mg/m ² /day	po	分2	12hr毎	●	●	●	●	●	●	●														
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	6mg/m ² /day	it															●	●							

備考
21週間を1コースとし、36ヶ月間継続する。
原著ではBCNUとなっているが、日本ではACNUで代用することが多い。

登録年月日
2004年 3月 18日

登録No.
No. 022