

診療科
血液内科

疾患名
急性リンパ性白血病

レジメ名
AdVP/L-AdVP 維持強化療法

投与間隔
1コース 計 コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|------|---------------------------|-----------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---|---|
| | | | | | | week1 | week2 | week3 | week4 | week5 | week6 | week7 | week8 | week9 | week10 | | |
| 維持療法 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メトレキサート | メトレキサート | MTX | 15mg/m ² /day | iv | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ロイケリン | メルカプトプリン | 6-MP | 70mg/m ² /day | po | | ● | ~ 毎日 ~ | | | | | | | | | ● | |
| 強化療法 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコビン | ビンクリスチン | VCR | 1.4mg/m ² /day | iv or div | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| エンドキサン | シクロホスファミド | CPA | 550mg/m ² /day | div | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| ロイケリン | メルカプトプリン | 6-MP | 70mg/m ² /day | po | | ● | ~ 毎日 ~ | | ● | | | | | | | | |
| プレドニゾン | プレドニゾン | PSL | 40mg/body/day | po | | ● | ~ 毎日 ~ | | ● | | | | | | | | |

備考
維持療法と強化療法の間には2週間の休薬期間をおく。

登録年月日
2004年 3月 18日

登録No.
No. 026