

診療科
血液内科

疾患名
中高悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫

レジメ名
DA-EPOCH-R

投与間隔
1コース 3~5週間 計 6~8コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | |
|----------|-----------|-----|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 |
| ラステット | エトポシド | ETP | 50mg/m ² /day | 持続点滴 | 96hr | ● | ● | ● | ● | |
| オンコビン | ビンクリスチン | VCR | 0.4mg/m ² /day | 持続点滴 | 96hr | ● | ● | ● | ● | |
| ドキシソルビシン | ドキシソルビシン | ADM | 10mg/m ² /day | 持続点滴 | 96hr | ● | ● | ● | ● | |
| エンドキサン | シクロホスファミド | CPA | 750mg/m ² /day | iv | | | | | | ● |
| プレドニゾン | プレドニゾン | PSL | 120mg/m ² /day | po | 分2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| リツキシマブ | リツキシマブ | | 375mg/m ² /day | iv | | ● | | | | |

備考
リツキサン： 副作用軽減のため、投与前にアセトアミノフェン0.5gを服用およびボララミン1A+生食100mLをdiv。
投与量により枝分かれレジメがある：
097-1:ETP50mg/m²/day ADM10mg/m²/day CPA750mg/m²/day、 097-2:ETP60mg/m²/day ADM12mg/m²/day CPA900mg/m²/day
097-3:ETP72mg/m²/day ADM14.4mg/m²/day CPA1080mg/m²/day、 097-4:ETP86.4mg/m²/day ADM17.3mg/m²/day CPA1296mg/m²/day
097-5:ETP103.7mg/m²/day ADM20.7mg/m²/day CPA1555mg/m²/day、 097-6:ETP124.4mg/m²/day ADM24.8mg/m²/day CPA1866mg/m²/day

登録年月日
2004年 5月 28日

登録No.
No. 097