

診療科  
乳腺外科

疾患名  
乳癌

レジメ名  
FEC (FEC75-100)

投与間隔  
1コース 3週間 計 6コース

| 商品名    | 一般名        | 略号   | 投与量                          | 投与方法 | 投与時間   | 投与日  |  |  |  |  |
|--------|------------|------|------------------------------|------|--------|------|--|--|--|--|
|        |            |      |                              |      |        | day1 |  |  |  |  |
| エピルビシン | エピルビシン     | EPI  | 75~100mg/m <sup>2</sup> /day | div  | 3~5min | ●    |  |  |  |  |
| エンドキサン | シクロフォスファミド | CPA  | 500mg/m <sup>2</sup> /day    | div  | 30min  | ●    |  |  |  |  |
| 5-FU   | フルオロウラシル   | 5-FU | 500mg/m <sup>2</sup> /day    | div  | 30min  | ●    |  |  |  |  |
|        |            |      |                              |      |        |      |  |  |  |  |
|        |            |      |                              |      |        |      |  |  |  |  |
|        |            |      |                              |      |        |      |  |  |  |  |
|        |            |      |                              |      |        |      |  |  |  |  |

備考  
EPIの投与量に応じて枝分かれレジメある: 134-1 (EPI: 75mg/m<sup>2</sup>)、134-2 (EPI: 100mg/m<sup>2</sup>)  
day1にアロキシ注0.75mg、イメンド125mg、デカドロン注9.9mg使用

登録年月日  
2006年 3月 7日

登録No.  
No. 134