

診療科  
外科、内科

疾患名  
進行・再発大腸癌

レジメ名  
FOLFIRI(+アバステチン)

投与間隔  
1コース                      2 週間                      計                      コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1	day2			
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup> /day	div	2~4min	●				
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400~3000mg/m <sup>2</sup> /クール	civ	46hrs	●	→			
レボホリナート	レボホリナートNa	I-LV	200mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●				
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150~180mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●				
アバステチン	ベバシズマブ		5 or 10mg/Kg/day	div	30~90min	(●)				

備 考  
副作用: 嘔気、嘔吐。貧血。白血球、血小板減少。下痢。  
day1にグラニセトン注3mg、デカドロン注6.6mg使用  
枝分かれレジメがある:  
147-1: ベバシズマブなし、147-2: ベバシズマブ5mg/kg入院用レジメ、147-3: ベバシズマブ10mg/kg入院用レジメ、  
147-4: ベバシズマブ5mg/kg外来用レジメ、147-5: ベバシズマブ10mg/kg外来用レジメ

登録年月日  
2007 年 10月 11日

登録No.  
No. 147