

診療科  
呼吸器内科、呼吸器外科

疾患名  
悪性胸膜中皮腫・非小細胞肺癌

レジメ名  
アリムタ+カルボプラチン併用療法

投与間隔  
1コース                      3週間                      計                      6コース

| 商品名     | 一般名     | 略号    | 投与量                       | 投与方法 | 投与時間   | 投与日  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|---------------------------|------|--------|------|--|--|--|--|
|         |         |       |                           |      |        | day1 |  |  |  |  |
| カルボプラチン | カルボプラチン | CBDCA | AUC5/day                  | div  | 1~3hrs | ●    |  |  |  |  |
| ペトレキセド  | ペトレキセド  |       | 500mg/m <sup>2</sup> /day | div  | 10min  | ●    |  |  |  |  |
|         |         |       |                           |      |        |      |  |  |  |  |
|         |         |       |                           |      |        |      |  |  |  |  |
|         |         |       |                           |      |        |      |  |  |  |  |

備考

- ・アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。  
アリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。
- ・アリムタ初回投与7日以上前にビタミンB1の21mgを筋肉内投与。その後、最初ビタミンB12を投与した日から約9週毎に1回1mgを反復投与。  
アリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。

枝分かれレジメがある  
163-1:通常レジメ、163-2:アロカリス注併用レジメ

163-1はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注6.6mg使用  
163-2はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注3.3mg、アロカリス注235mg使用

2022/5 アリムタからペトレキセドへ変更

登録年月日(適応追加)  
2009年 6月 10日

登録No.  
No. 163