

診療科
内科、外科

疾患名
胆道、膵癌

レジメ名
ゲムシタビン(ジェムザール)+S-1療法

投与間隔
1コース 3週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日			
						day1	day8		
ゲムシタビン	ゲムシタビン	GEM	1000mg/m ² /day	div	30min	●	●		
エスワンタイホウ配合OD錠			80~120mg/body/day	po	分2	day1~14経口投与			

備考
day1,8にグラニセトロン注3mg、デカドロン注3.3mg使用

★術前補助(Prep-02/JSAP05) 原則2コース行う。
S1投与量:体表面積 < 1.25 1日80mg(1回20mg×2cap 1日2回)
1.25~1.5 1日100mg(1回25mg×2cap 1日2回)
1.5< 1日120mg(1回20mg×3cap 1日2回)

★進行再発(GEST、JCOG1113)初回用量は以下の通りである。
安全性に問題なければ2コースから60mg→80mg/日、80mg→100mg/日、100mg→120mg/日に増量可
S1投与量:体表面積 < 1.25 1日60mg(朝40mg 夕20mg)
1.25~1.5 1日80mg(1回20mg×2cap 1日2回)
1.5< 1日100mg(1回25mg×2cap 1日2回)

登録年月日
2008年 6月 26日

登録No.
No. 181