

診療科  
内科、外科

疾患名  
進行・再発大腸癌

レジメ名  
FOLFOX4法＋パニツムマブ

投与間隔  
1コース  
2週間  
計  
コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day2				
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup> /day	div	2~4min	●	●				
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	600mg/m <sup>2</sup> /day	civ	22hrs	●	●				
レボホリナート	レボホリナートNa	l-LV	100mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●	●				
オキサリプラチン	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●					
ベクティビックス	パニツムマブ		6mg/Kg/day	div	1hr	●					

備考

主な副作用：  
骨髄抑制、粘膜障害（口内炎、下痢）、嘔気、嘔吐、肝障害、腎障害、皮膚障害、アレルギー、ショック、末梢神経障害等  
間質性肺疾患の既往歴、心疾患又はその既往歴のある患者は慎重投与。

day1、2にグラニセトン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

登録年月日  
2010年9月9日

登録No.  
No. 224