

診療科  
外科、内科

疾患名  
進行・再発大腸癌

レジメ名  
FOLFIRI+パニツムマブ

投与間隔  
1コース                      2週間                      計                      コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day2	day8			
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup> /day	div	2~4min	●					
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400~3000mg/m <sup>2</sup> /サイクル	civ	46hrs	●	→				
レボホリナート	レボホリナートNa	l-LV	200mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●					
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150~180mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●					
ベクティビックス	パニツムマブ		6mg/Kg/day	div	1hr	●					

備考

主な副作用: 骨髄抑制、粘膜障害(口内炎、下痢)、嘔気、嘔吐、肝障害、腎障害、皮膚障害、アレルギー、ショック等  
間質性肺疾患の既往歴、心疾患又はその既往歴のある患者は慎重投与。

day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

登録年月日  
2010年9月9日

登録No.  
No. 225