

診療科
血液内科

疾患名
低悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫、マントル細胞リンパ腫

レジメ名
ベンダムスチン+リツキシマン併用療法

投与間隔
1コース 4週間 計 4~6 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day2	day3			
①リツキシマブ	リツキシマブ		375mg/m ² /day	div	下記参照	●					
①トレアキシン	ベンダムスチン		90mg/m ² /day	div	10min		●	●			
②リツキシマブ	リツキシマブ		375mg/m ² /day	div	下記参照	●					
②トレアキシン	ベンダムスチン		90mg/m ² /day	div	10min	●	●				

備考

副作用軽減のため、投与前にアセトアミノフェン0.5gを服用およびポララミン1A+生食100mLをdiv。
 なお、リツキシマンは、1コース目の7日前及び最終コースの4週後に単独投与を追加する。
 2~4コースで効果不十分の時は6コースまで延長できる。
 枝分かれレジメがある
 238-1:上記①、238-2:上記②

238-1はday2、3にグラニセトロン注3mg使用
 238-2はday1、2にグラニセトロン注3mg使用

2022/8 添付文書改訂のためベンダムスチン投与時間1時間から10分に変更

登録年月日
2011年 3月 9日

登録No.
No. 238