

診療科  
内科、外科

疾患名  
平滑筋肉腫

レジメ名  
ドキソルビシン単独療法(肉腫2nd line)

投与間隔  
1クール                      3週間                      計                      クール

| 商品名     | 一般名     | 略号  | 投与量                      | 投与方法 | 投与時間 | 投与日  |      |      |  |  |  |
|---------|---------|-----|--------------------------|------|------|------|------|------|--|--|--|
|         |         |     |                          |      |      | day1 | day2 | day3 |  |  |  |
| ドキソルビシン | ドキソルビシン | DXR | 25mg/m <sup>2</sup> /day | iv   |      | ●    | ●    | ●    |  |  |  |
|         |         |     |                          |      |      |      |      |      |  |  |  |
|         |         |     |                          |      |      |      |      |      |  |  |  |
|         |         |     |                          |      |      |      |      |      |  |  |  |
|         |         |     |                          |      |      |      |      |      |  |  |  |
|         |         |     |                          |      |      |      |      |      |  |  |  |
|         |         |     |                          |      |      |      |      |      |  |  |  |

備 考  
定期的に心エコーを実施する。  
蓄積量が450mg/m<sup>2</sup>で終了とする。

登録年月日  
2011年 5 月 11 日

登録No.  
No. 241