

診療科  
**乳腺外科**

疾患名  
**乳癌**

レジメ名  
 パージェタ+ハーセプチン+ナベルビンorGEM療法

投与間隔  
**1コース                      3週間                      until PD**

| 商品名     | 一般名    | 略号  | 投与量                          | 投与方法  | 投与時間    | 投与日  |      |  |  |  |
|---------|--------|-----|------------------------------|-------|---------|------|------|--|--|--|
|         |        |     |                              |       |         | day1 | day8 |  |  |  |
| ロゼウス    | ビンレルビン | VNB | 25mg/m <sup>2</sup> /day     | div   | 10min全開 | ●    | ●    |  |  |  |
| ゲムシタビン  | ゲムシタビン | GEM | (1000mg/m <sup>2</sup> /day) | (div) | (30min) | (●)  | (●)  |  |  |  |
| ①パージェタ  | ペルズツマブ |     | 840mg/body/day               | div   | 1hr     | ●    |      |  |  |  |
| ①ハーセプチン | トラスツマブ |     | 8mg/Kg/day                   | div   | 90min   | ●    |      |  |  |  |
| ②パージェタ  | ペルズツマブ |     | 420mg/body/day               | div   | 1hr     | ●    |      |  |  |  |
| ②ハーセプチン | トラスツマブ |     | 6mg/Kg/day                   | div   | 90min   | ●    |      |  |  |  |

備考

①は初回のみ、②は2回目以降の投与量とする。  
 副作用： 心機能低下、骨髄抑制、静脈炎、倦怠感等

枝分かれレジメがある：  
 304-1:ビンレルビン初回導入用、304-2:ビンレルビン二回目以降用、304-3:GEM1000mg/m<sup>2</sup>初回導入用、  
 304-4:GEM1000mg/m<sup>2</sup>二回目以降用、304-5:GEM1250mg/m<sup>2</sup>初回導入用、304-6:GEM1250mg/m<sup>2</sup>二回目以降用

ビンレルビンレジメはday1にグラニセロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用 day8にグラニセロン注3mg使用  
 GEMレジメはday1、8にグラニセロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

登録年月日  
**2014年2月5日**

登録No.  
**No. 304**