

診療科  
婦人科

疾患名  
Ⅲ、Ⅳ期卵巣癌

レジメ名  
TC-アバスチン療法

投与間隔  
1コース      3～4 週間      計      コース

| 商品名     | 一般名     | 略号    | 投与量                       | 投与方法 | 投与時間     | 投与日  |  |  |  |  |
|---------|---------|-------|---------------------------|------|----------|------|--|--|--|--|
|         |         |       |                           |      |          | day1 |  |  |  |  |
| タキソール   | パクリタキセル | TXL   | 175mg/m <sup>2</sup> /day | div  | 3hrs     | ●    |  |  |  |  |
| カルボプラチン | カルボプラチン | CBDCA | AUC 5～6                   | div  | 1hr      | ●    |  |  |  |  |
| アバスチン   | ベバシズマブ  |       | 15mg/Kg/day               | div  | 30～90min | ●    |  |  |  |  |
|         |         |       |                           |      |          |      |  |  |  |  |

備 考

手術後28日以内は、1コース目としてTC療法のみ行い、2コース目よりTC療法にアバスチンを加える。  
2-6コース目はTC-アバスチン療法を行う。7-16コース目はアバスチン単剤とする。

枝分かれレジメがある：  
306-1: TC[175/5.0]、306-2: TC[175/5.0]+Bev  
306-3: TC[175/5.5]、306-4: TC[175/5.5]+Bev  
306-5: TC[175/6.0]、306-6: TC[175/6.0]+Bev  
306-7: Bevのみ

306-1、306-2、306-3、306-4、306-5、306-6はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注6.6mg使用  
306-7は静注制吐剤なし

登録年月日  
2014 年 3 月 5 日

登録No.  
No. 306