

診療科  
**消化器外科**

疾患名  
**進行・再発大腸癌**

レジメ名  
**mFOLFOX6+セツキシマブ**

投与間隔  
**1コース                      2週間                      計                      コース**

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day2	day8			
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup> /day	bolus	3~15min	●					
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup> /コース	civ	46hrs	●	→				
レボホリナート	レボホリナートNa	l-LV	200mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●					
オキサリプラチン	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●					
①アービタックス	セツキシマブ	Cmab	400mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●(初回)					
②アービタックス	セツキシマブ		250mg/m <sup>2</sup> /day	div	1hr	●(2回目以降)	●				

**備 考**

1コースを2週間とし、能な限り反復投与する。

主な副作用：骨髄抑制、粘膜障害(口内炎、下痢)、嘔気、嘔吐、肝障害、腎障害、皮膚障害、アレルギー、ショック、末梢神経障害

枝分かれレジメがある：  
 307-1：初回導入用、307-2：二回目以降用

day1, 8にグラニセトン注3mg、デカドロン注6.6mg使用  
 day8にデカドロン注6.6mg使用

登録年月日  
**2014年3月5日**

登録No.  
**No. 307**