

診療科  
脳外科

疾患名  
悪性神経膠腫

レジメ名  
初発テモダール(+アバスチン)療法+RT<sup>(※注)</sup>

投与間隔  
1コース 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
						day1	day2	day3	day4	day5	→→	day42	
(放射線照射併用時)													
テモダール	テモゾロミド		75mg/m <sup>2</sup> /day	div	90min	●	●	●	●	●	→→	●	
(放射線照射終了後単独時)													
テモダール	テモゾロミド		150mg/m <sup>2</sup> /day	div	90min	●	●	●	●	●			

備考

**※注釈:原則として放射線療法とアバスチン療法(No.311)を併用する。**

- 放射線併用時:テモゾロミドとして75mg/m<sup>2</sup>/day 1日1回42日間投与。4週間休薬し1コース10週間とする。
- 少なくとも週1回以上の血液検査の実施する。
- ニューモシスチス肺炎の予防として、バクタ1g/日、悪心・嘔吐の予防として、ナゼアOD錠0.1mg/日を投与する。
- 経口投与が可能となった時点から、経口剤に切り替えることを原則とする。

静注制吐剤なし

登録年月日  
2014年 6月 4日

登録No.  
No. 310