

診療科
血液内科

疾患名
再発・難治性ホジキンリンパ腫

レジメ名
オプジーボ療法

投与間隔
1コース 2週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
						day1							
オプジーボ	ニボルマブ	NIVO	240mg/body	div	1hr	●							

備 考
免疫関連有害事象(重症筋無力症[頻度不明]・筋炎[頻度不明]・大腸炎[1.2%]・重度下痢[0.6%]・1型糖尿病[頻度不明]・肝機能障害[2.9%]・肝炎[頻度不明]・末梢性ニューロパチー[2.4%]・その他の神経障害:多発ニューロパチー・ギランバレー症候群・脱髄[頻度不明]・尿細管間質性腎炎[頻度不明]・副腎機能不全[1.2%]・脳炎[頻度不明])、間質性肺炎[5.3%]、甲状腺機能低下症[10.6%]、甲状腺機能亢進症[1.8%]、甲状腺炎[2.4%]、Infusion reaction[1.8%]などの報告がある。適切な鑑別診断を行い、副腎皮質ホルモン剤の投与など適切な処置を行う。

静注制吐剤なし

登録年月日
2017年 2月 1日

登録No.
No. 364