

診療科  
**消化器内科・消化器外科**

疾患名  
**進行・再発大腸癌**

レジメ名  
**ザルトラップ＋FOLFIRI**

投与間隔  
**1コース                      2週間                      計                      コース**

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
						day1	day2						
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup> /day	bolus	2～4min	●							
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup> /コース	civ	46hrs	●	→						
レボホリナート	レボホリナートNa	l-LV	200mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●							
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●							
ザルトラップ	アフリベルセプトヘータ	AFL	4mg/kg/day	div	1hr	●							

備 考

1コースを2週間とし、可能な限り反復投与する。

・二次化学療法として使用する。

主な副作用：嘔気、嘔吐、貧血、白血球減少、下痢、出血、血栓症、高血圧、尿蛋白

枝分かれレジメがある  
 378-1:5FU 携帯型持続注入ポンプ使用、378-2:5FU 輸液に混注(入院用)

day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

登録年月日  
**2017年 11月 1日**

登録No.  
**No. 378**