

診療科  
血液内科

疾患名  
再発/難治性CD22陽性急性リンパ性白血病

レジメ名  
ベスポンサ療法

投与間隔  
1コース 3~4週間 計 3~6コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day8	day15			
ベスポンサ	イノツズマブ・オゾガマイシン		0.8mg/m <sup>2</sup> /day	div	1時間	(● <sup>*1</sup> )					
ベスポンサ	イノツズマブ・オゾガマイシン		0.5mg/m <sup>2</sup> /day	div	1時間	(● <sup>*2</sup> )	●	●			

備考(実施手順、使用器具、予測される副作用とその対応、休薬・減量・中止基準、患者への注意事項等)

- ・投与60~30分前に副腎皮質ステロイド、解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤でinfusion reaction予防を行う。
- ・1サイクル目は原則21日間、ただし寛解が28日間まで延長できる。2サイクル目以降は各サイクル28日間
- ・投与サイクル数は造血幹細胞移植を予定している場合は、本剤の効果が得られる最小限のサイクル数とする。治療上やむを得ないと判断される場合を除き、3サイクル終了までに投与を中止する(2サイクル以下が望ましい)。造血幹細胞移植を予定していない場合は6サイクルまで投与を繰り返すことができるが、3サイクル終了までに効果が得られない場合は投与を中止する。

登録年月日  
2018年8月1日

登録No.  
No. 388