

診療科
呼吸器内科

疾患名
進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメ名
CDDP+PEM+キイトルーダ療法

投与間隔
1コース 3週間 計 4コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1				
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75mg/m ² /day	div	2hrs	●				
ペトレキセド	ペトレキセド	PEM	500mg/m ² /day	div	10min	●				
キイトルーダ	ペムブロリズマブ		200mg/body/day	div	30min	●				

備考

1)アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。
アリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。
アリムタ初回投与7日以上前に1mgを筋肉内投与。その後、最初ビタミンB12を投与した日から約9週毎に1回1mgを反復投与。
アリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。

2)4コース施行し、SD以上の症例においては、PEM+キイトルーダ療法による維持療法の施行について検討する。

枝分かれレジメがある：
031-1:通常レジメ、032-2:ショートハイドレーションレジメ

day1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注9.9mg、アロカリス注235mg使用しday2、day3にはデカドロン注6.6mg使用

2022/5 アリムタからペトレキセドへ変更

登録年月日
2019年 1月 9日

登録No.
No. 400