

診療科  
呼吸器内科

疾患名  
進行再発非扁平上皮非小細胞肺がん

レジメ名  
CBDCA+PEM+キイトルーダ療法

投与間隔  
1コース                      3週間                      計                      4コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1				
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC5/day	div	1hrs	●				
ペトレキセド	ペトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup> /day	div	10min	●				
キイトルーダ	ペムプロリズマブ		200mg/body/day	div	30min	●				

備考

1)アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。  
アリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。  
アリムタ初回投与7日以上前に1mgを筋肉内投与。その後、最初ビタミンB12を投与した日から約9週毎に1回1mgを反復投与。  
アリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。

2)4コース施行し、SD以上の症例においては、PEM+キイトルーダ療法による維持療法の施行について検討する。

枝分かれレジメがある：  
401-1:通常レジメ、401-2:アロカリス併用レジメ

401-1はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注6.6mg使用  
401-2はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注3.3mg、アロカリス注235mg使用

2022/5 アリムタからペトレキセドへ変更

登録年月日  
2019年1月9日

登録No.  
No. 401