

診療科
呼吸器内科

疾患名
進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメ名
PEM+キイトルーダ維持療法

投与間隔
1コース 3週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1				
アリムタ	ペトレキセド	PEM	500mg/m ² /day	div	10min	●				
キイトルーダ	ペムブロリズマブ		200mg/body/day	div	30min	●				

備 考

1)アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。
アリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。
アリムタ初回投与7日以上前に1mgを筋肉内投与。その後、最初ビタミンB12を投与した日から約9週毎に1回1mgを反復投与。
アリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。

2)本レジメンは、CDDP+PEM+キイトルーダ療法、CBDCA+PEM+キイトルーダ療法を4コース施行しSD以上の症例に対して維持療法として行う。

day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注3.3mg使用

登録年月日
2019年 1 月 9 日

登録No.
No. 402