

診療科
血液内科

疾患名
Ph1(-)急性リンパ性白血病

レジメ名
JALSG ALL202-O consolidation(C1,C4) therapy

投与間隔
1コース 3週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
						day1	day2	day3						
シタラビン	シタラビン	AraC	2g/m ² x2	div	3時間12時間間隔	●●	●●	●●						
エトポシド	エトポシド	VP16	100mg/m ²	div	1時間	●	●	●						
デカドロン	デキサメサゾン	DEX	40(33)mg/body	div	1時間	●	●	●						
メソトレキセート	メソトレキセート	MTX	15mg/body	it		●								
デカドロン	デキサメサゾン	DEX	3.3mg/body	it		●								

備考

- ・葉酸の併用: 初回投与10日以上前から、葉酸として1日1回1.0~1.25mgを連日経口投与(本剤終了日から30日後までは継続)
- ・VB12の併用: 初回投与10日以上前から、VB12として1日1回1mgを8~10週ごとに筋肉内投与(本剤投与中は継続)
- ・本剤投与前に歯科コンサルトを行い、口腔内のスクリーニング・口腔ケア指導を行う。
- ・注意する副作用: 粘膜炎、骨髄抑制、皮膚障害、感染症、腫瘍崩壊症候群、間質性肺炎など

登録年月日
2019年 2月 6日

登録No.
No. 408