

診療科  
血液内科

疾患名  
中枢神経悪性リンパ腫

レジメ名  
MR-CHOP

投与間隔  
1コース                      3週間                      計                      6                      コース

| 商品名      | 一般名        | 略号  | 投与量                  | 投与方法       | 投与時間 | 投与日  |      |      |      |      |     |     |     |  |
|----------|------------|-----|----------------------|------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|
|          |            |     |                      |            |      | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 | day | day | day |  |
| メソトレキサート | メソトレキサート   | MTX | 2g/m <sup>2</sup>    | div        | 3時間  | ●    |      |      |      |      |     |     |     |  |
| リツキシマブ   | リツキシマブ     |     | 375mg/m <sup>2</sup> | div        | *    | ●    |      |      |      |      |     |     |     |  |
| エンドキサン   | シクロフォスファミド | CPA | 750mg/m <sup>2</sup> | div        | 2時間  |      |      | ●    |      |      |     |     |     |  |
| ドキシソルビシン | ドキシソルビシン   | ADM | 50mg/m <sup>2</sup>  | div        | 30分  |      |      | ●    |      |      |     |     |     |  |
| オンコビン    | ビンクリスチン    | VCR | 1.4mg/m <sup>2</sup> | i.v or div | 15分  |      |      | ●    |      |      |     |     |     |  |
| プレドニゾロン  | プレドニゾロン    | PSL | 100mg/body/day       | po         |      | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |     |     |     |  |

備 考

・リツキシマブの副作用軽減のため投与前にアセトアミノフェン 0.5gを服用、およびポララミン1Aを投与する。

登録年月日  
2019年 2月 6日

登録No.  
No. 412