

診療科  
血液内科

疾患名  
濾胞性リンパ腫

レジメ名  
G-CHOP療法(サイクル2-6)

投与間隔  
1コース 3週間 計 5 コース(計8コース)

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日							
						day1	day2	day3	day4	day5	day	day	day
ガザイバ	オビヌツズマブ	G	1000mg/body/day	div	3時間15分	●							
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m2	div	1時間30分	●							
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	50mg/m2	div	15分	●							
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m2 (max 2mg)	div	5分	●							
プレドニゾロン	プレドニゾロン	PSL	100mg/body/day	po		●	●	●	●	●			

備考

- ・Infusion reaction対策として、ガザイバ投与30分前にジフェンヒドラミン、アセトアミノフェンの前投与を行う。
- ・1回目G-CHOP療法(サイクル1)(No.413)、2-6回目以降G-CHOP療法(サイクル2-6)(No.414)へ移行し、7-8回目以降G-CHOP療法(サイクル7-8)(No.415)へ移行し、その後オビヌツズマブ維持療法(No.418)を行う。

day1にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日  
2019年 3月 日

登録No.  
No. 414