

診療科
血液内科

疾患名
再発又は難治性B-ALL

レジメ名
ビーリンサイト療法 45kg未満(サイクル1)

投与間隔
1コース 6週間 計 コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | |
|---------|---------|----|---|------|------|--------|---------|----------|--|
| | | | | | | day1~7 | day8~28 | day29~42 | |
| ビーリンサイト | ブリナツモマブ | | 5 μ g/m ² (max9 μ g) | 持続静注 | 24時間 | ● | | | |
| ビーリンサイト | ブリナツモマブ | | 15 μ g/m ² (max28 μ g) | 持続静注 | 24時間 | | ● | 休み | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

備 考

- ・骨髄中の芽球の割合が50%超、又は末梢血中の芽球数が15000/ μ L以上の場合には、デキサメタゾンによる前治療を検討する。
- ・サイトカイン放出症候群(CRS)の発現を軽減するため、各サイクルの投与開始前1時間以内、および用量増量前1時間以内にデキサメタゾン20mgの静注を前投与として行う。なお、投与中断後、投与を再開する場合も同様の前投与を行う。

登録年月日
2019年 10月 2日

登録No.
No. 425