

診療科
血液内科

疾患名
再発・難治性多発性骨髄腫

レジメ名
EPd療法(3サイクル目以降～)

投与間隔
1コース 4 週間 計 無効となるまで

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1	day8	day15	day21	day22
エムプリシティ	エロツズマブ	ELO	20mg/kg/day	div		●				
ポマリスト	ポマリドミド	POM	4mg/body/day	p.o.		day1～21連日投与				
デキサメタゾン	デキサメタゾン	DEX	8mg/body/day	div	ELO45分前に投与完了	●				
レナデックス(75才以下)	デキサメタゾン	DEX	28mg/body/day	p.o.		●				
レナデックス(75才超)	デキサメタゾン	DEX	8mg/body/day	p.o.		●				
レナデックス(75才以下)	デキサメタゾン	DEX	40mg/body/day	p.o.			●	●		●
レナデックス(75才超)	デキサメタゾン	DEX	20mg/body/day	p.o.			●	●		●

備 考
 ※ レナデックスは75才以下は28mg、75才超は8mgへ減量となる
 ・前投与：エムプリシティ投与3時間前までにDEX28mg po、45分前までにDEX8mg divを分割投与すること、30分前までに抗ヒスタミン薬、H2ブロッカー、アセトアミノフェン(300-1000mg)を投与する。
 ・day1にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日
2019年 12月 4日

登録No.
No. 434