

診療科  
呼吸器内科

疾患名  
進行再発非扁平上皮非小細胞肺癌

レジメ名  
CDDP+PEM+テセントリク療法

投与間隔  
1コース 3週間 計 4~6 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1				
シスプラチン	シスプラチン	CDDP	75mg/m <sup>2</sup> /day	div	2hrs	●				
ペトレキセド	ペトレキセド	PEM	500mg/m <sup>2</sup> /day	div	10min	●				
テセントリク	アテゾリズマブ		1200mg/body/day	div	1hrs	●				

備考

アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。  
アリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。  
アリムタ初回投与7日以上前に1mgを筋肉内投与。その後、最初ビタミンB12を投与した日から約9週毎に1回1mgを反復投与。  
アリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。  
上記レジメ4~6コース終了後、SD以上ならば、PEM+テセントリクの維持療法を行う。

枝分かれレジメがある：  
031-1:通常レジメ、032-2:ショートハイドレーションレジメ

day1にアロキシ注0.75mg、アロカリス注235mg、デカドロン注9.9mg使用

2022/5 アリムタからペトレキセドへ変更

登録年月日  
2019年 12月 4日

登録No.  
No. 435