

診療科
血液内科

疾患名
T細胞性リンパ腫

レジメ名
CHOEP (CHFEP) 療法

投与間隔
1コース 3週間 計6～8コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日						
						day1	day2	day3	day4	day5		
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m ² /day	div	1時間	●						
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	50mg/m ² /day	div	15分	●						
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m ² /day	div	15分	●						
(フィルデシン)			(2mg/m ² /day)	(div)	(15分)	(●)						
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	100mg/body/day	po		●	●	●	●	●		
エトポシド	エトポシド	ETP	100mg/m ² /day	div	2時間	●						
ラステット	エトポシド	ETP	200mg/m ² /day	po			●	●				

備考
21～28日間を1クールとする。
VCRは最大2mg/dayとする。
神経障害の副作用軽減のため、オンコビンをフィルデシン(2mg/m²/day)に変更する場合がある。
枝分かれレジメン448-1:CHOEP療法、448-2:CHFEP療法
CHOEP療法の原法ではETP100mg/m²静注[day1-3]であるが、NCCNガイドラインの推奨に準じて
day2-3からETP200mg/m²内服に変更する。
day1にアロキシ注0.75mg使用

登録年月日
2020年 8月 12日

登録No.
No. 448