

診療科
血液内科

疾患名
非ホジキンリンパ腫

レジメ名
CHOP (CHFP)

投与間隔
1コース 3~4週間 計6~8コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間		投与日					
					外来	入院	day1	day2	day3	day4	day5	
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m ² /day	div	90分	120分	●					
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	50mg/m ² /day	div	15分	30分	●					
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1. 4mg/m ² /day	iv or div	5分	15分	●					
(フィルデシン)			(2mg/m ² /day)	(iv or div)	(5分)	(15分)	(●)					
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	100mg/body/day	po			●	●	●	●	●	

備考

21-28日間を1コースとする。
 VCRは最大2mg/dayとする。
 神経障害の副作用軽減のため、オンコビンをフィルデシン(2mg/m²/day)に変更する場合がある。

枝分かれレジメがある:
 001-1: 外来レジメ、001-2: 入院レジメ、001-3: フィルデシン使用の外来レジメ、001-4: フィルデシン使用の入院レジメ

day1にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日
2004年 3月 18日

登録No.
No. 001