

診療科  
血液内科

疾患名  
非ホジキンリンパ腫

レジメ名  
R-CHOP (R-CHFP)

投与間隔  
1コース 3～4週間 計6～8コース

| 商品名      | 一般名       | 略号  | 投与量                        | 投与方法        | 投与時間 |       | 投与日  |      |      |      |      |  |
|----------|-----------|-----|----------------------------|-------------|------|-------|------|------|------|------|------|--|
|          |           |     |                            |             | 外来   | 入院    | day1 | day2 | day3 | day4 | day5 |  |
| エンドキサン   | シクロホスファミド | CPA | 750mg/m <sup>2</sup> /day  | div         | 90分  | 120分  | ●    |      |      |      |      |  |
| ドキシソルビシン | ドキシソルビシン  | ADM | 50mg/m <sup>2</sup> /day   | div         | 15分  | 30分   | ●    |      |      |      |      |  |
| オンコビン    | ビンクリスチン   | VCR | 1. 4mg/m <sup>2</sup> /day | iv or div   | 5分   | 15分   | ●    |      |      |      |      |  |
| (フィルデシン) |           |     | (2mg/m <sup>2</sup> /day)  | (iv or div) | (5分) | (15分) | (●)  |      |      |      |      |  |
| プレドニゾロン  | プレドニゾロン   | PSL | 100mg/body/day             | po          |      |       | ●    | ●    | ●    | ●    | ●    |  |
| リツキシマブ   | リツキシマブ    |     | 375mg/m <sup>2</sup> /day  | div         |      |       | ●    |      | (●)  |      |      |  |

備 考

VCRは最大2mg/dayとする。  
 リツキシマブはday1かday3のいずれかに投与する。  
 神経障害の副作用軽減のため、オンコビンをフィルデシン(2mg/m<sup>2</sup>/day)に変更する場合がある。

枝分かれレジメがある  
 002-1: 外来レジメ、002-2: 入院レジメ、002-3: 分割入院レジメ、002-4: 分割外来レジメ  
 002-5: フィルデシン使用外来レジメ、002-6: フィルデシン使用入院レジメ、  
 002-7: フィルデシン使用分割外来レジメ、002-8: フィルデシン使用分割入院レジメ

アセトアミノフェンは300mgで内服、外来R-CHOPのポララミンは内服、入院R-CHOPのポララミンは点滴で使用。

day1にグラニセトロン注3mg使用

登録年月日  
2004 年 3月 18日

登録No.  
No. 002