| 診療科 | 疾患名 |
|---|---|
| 血液内科 | 急性リンパ性白血病 |

| レジメ名 | 投与間隔 |
|---|---|
| ModifiedL17（L17M） 地固め療法 | 1コース |

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | week | 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | | | — | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | — | — | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | — | | 60 | — |
| ダウノマイシン | ダウノルビシン | DNR | 60mg／㎡／day | div | | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンドキサン | シクロホスファミド | CPA | 1200mg／㎡／day | div | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| キロサイド | シタラビン | Ara-C | 25mg／㎡／day | div | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キロサイド | シタラビン | Ara-C | 200mg／㎡／day | civ | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| ロイケリン | メルカプトプリン | 6-MP | 100mg／㎡／day | po | 分2 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メソトレキセート | メトトレキサート | MTX | 15mg／㎡／day | div | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| メソトレキセート | メトトレキサート | MTX | 6mg／㎡／day | it | | | ● | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| ロイナーゼ | L－アスパラギナーゼ | L-Asp | 20000U／㎡／day | div | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |

備　　考

寛解導入療法から5日間あけて地固め療法を施行

| 登録年月日 | 登録No. |
|---|---|
| 2004 年　3月 18日 | No.　021 |