

診療科
血液内科

疾患名
ホジキン病

レジメ名
COPP/ABV Hybrid療法

投与間隔
1コース 4週間

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日													
						day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	day9	day10	day11	day12	day13	day14
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	600mg/m ² /day	div		●													
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.4mg/m ² /day	iv or div		●													
ナツラン	プロカルバジン	PCZ	100mg/m ² /day	po		●	●	●	●	●	●	●							
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	40mg/m ² /day	po		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	35mg/m ² /day	div									●						
プレオ	プレオマイシン	BLM	10mg/m ² /day	div									●						
エクザール	ビンブラスチン	VLB	6mg/m ² /day	iv or div									●						
ハイドロコートン	ヒドロコルチゾン		100mg/body/day	iv or div									●						

備考
 骨髄抑制を来す薬剤(CPA,PCZ,VLB)は、末梢血顆粒球数800/μ l以上1600/μ l以下或いは血小板75000/μ l以上125000/μ l以下の場合は50%減量。
 末梢血顆粒球数800/μ l未満または血小板75000/μ l未満の場合は治療を1週間延期。
 骨髄への浸潤を伴っている場合は、末梢血の血算によらず最初の1コースは減量せず施行。
 重篤な知覚障害或いは運動神経障害が出現した場合は、VCRを中止。
 VCRによる腸管麻痺が起こった場合は、それ以後の投与量を50%減量。
 呼吸器症状を有する場合またはDlcoが治療前の50%以下に低下した場合は、BLMの投与は中 CPA、PCZを50%減量

登録年月日
2004年 3月 18日

登録No.
No. 010