

診療科
血液内科

疾患名
中高悪性度B細胞性非ホジキンリンパ腫

レジメ名
DA-EPOCH-R

投与間隔
1コース 3~5週間 計 6~8コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日				
						day1	day2	day3	day4	day5
ラステット	エトポシド	ETP	50mg/m ² /day	持続点滴	96hr	●	●	●	●	
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	0.4mg/m ² /day	持続点滴	96hr	●	●	●	●	
ドキシソルビシン	ドキシソルビシン	ADM	10mg/m ² /day	持続点滴	96hr	●	●	●	●	
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	750mg/m ² /day	iv						●
プレドニゾン	プレドニゾン	PSL	120mg/m ² /day	po	分2	●	●	●	●	●
リツキシマブ	リツキシマブ		375mg/m ² /day	iv		●				

備考
リツキサン： 副作用軽減のため、投与前にアセトアミノフェン0.5gを服用およびボララミン1A+生食100mLをdiv。
投与量により枝分かれレジメがある：
097-1:ETP50mg/m²/day ADM10mg/m²/day CPA750mg/m²/day、 097-2:ETP60mg/m²/day ADM12mg/m²/day CPA900mg/m²/day
097-3:ETP72mg/m²/day ADM14.4mg/m²/day CPA1080mg/m²/day、 097-4:ETP86.4mg/m²/day ADM17.3mg/m²/day CPA1296mg/m²/day
097-5:ETP103.7mg/m²/day ADM20.7mg/m²/day CPA1555mg/m²/day、 097-6:ETP124.4mg/m²/day ADM24.8mg/m²/day CPA1866mg/m²/day

登録年月日
2004年 5月 28日

登録No.
No. 097