

診療科
血液内科

疾患名
再発・難治性悪性リンパ腫

レジメ名
R-DEX-MEAM

投与間隔
1コース 3～4週間 計1～3コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日									
						day1	day2	day3	day4	day5	day6	day7	day8	day9	day10
リツキシマブ	リツキシマブ		375mg/m ² /day	div		●※1									
デカドロン	デキサメタゾン	DEX	8mg×3/day	div or p.o		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サイメリン	ラニムスチン	MCNU	60mg/m ² /day	div	1hr		●								
エトポシド	エトポシド	ETP	100mg/m ² /day	div	90mins				●	●	●	●			
キロサイド	シタラビン	Ara-C	100mg/m ² ×2/day	div	2hrs×2				●●	●●	●●	●●			
アルケラン	メルファラン	L-PAM	20mg/m ² /day	div	1hr			●							

備 考

除外規定: 70歳以上(65-69歳は全身状態を考慮して決定)、重度の心機能障害。肝機能障害・腎機能障害を有する症例
 感染予防のため、ニューキノロン系抗菌薬、アゾール系抗真菌薬の投与を考慮する。
 予測される副作用: 骨髄抑制(白血球減少、赤血球減少、血小板減少)、腎機能障害、肝機能障害、間質性肺炎、脱毛、嘔気・嘔吐、
 粘膜障害など
 ※1: T細胞性リンパ腫およびホジキンリンパ腫ではリツキシマブの投与は行わない。

登録年月日(改変日)
2017 年 8 月 17 日

登録No.
No. 118-2