

診療科
外科、内科

疾患名
進行・再発大腸癌

レジメ名
FOLFIRI(+アバスチン)

投与間隔
1コース 2 週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day2				
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ² /day	div	2～4min	●					
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400～3000mg/m ² /クール	civ	46hrs	●	→				
レボホリナート	レボホリナートNa	I-LV	200mg/m ² /day	div	2hrs	●					
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150～180mg/m ² /day	div	2hrs	●					
アバスチン	ペバシズマブ		5 or 10mg/Kg/day	div	30～90min	(●)					

備 考
副作用:嘔気、嘔吐。貧血。白血球、血小板減少。下痢。

day1にグラニセトン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

枝分かれレジメがある:
147-1:ペバシズマブなし、147-2:ペバシズマブ5mg/kg入院用レジメ、147-3:ペバシズマブ10mg/kg入院用レジメ、
147-4:ペバシズマブ5mg/kg外来用レジメ、147-5:ペバシズマブ10mg/kg外来用レジメ

登録年月日
2007 年 10月 11日

登録No.
No. 147