

診療科
呼吸器内科、呼吸器外科

疾患名
悪性胸膜中皮腫・非小細胞肺癌

レジメ名
アリムタ+カルボプラチン併用療法

投与間隔
1コース 3 週間 計 6 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1					
カルボプラチン	カルボプラチン	CBDCA	AUC5/day	div	1~3hrs	●					
ペトレキセド	ペトレキセド		500mg/m ² /day	div	10min	●					

備 考

- ・アリムタ投与7日以上前から、1日1回、総合ビタミン剤1g(葉酸0.5mg含有、当院ではパンビタン)を連日投与。
アリムタ投与中止後、最終投与日から22日目まで可能な限り投与継続。
- ・アリムタ初回投与7日以上前にビタミンB1の21mgを筋肉内投与。その後、最初ビタミンB12を投与した日から約9週毎に1回1mgを反復投与。
アリムタの投与中止後も、同じ投与方法で本剤の最終投与日から22日目まで可能な限り投与。

枝分かれレジメがある
163-1:通常レジメ、163-2:アロカリス注併用レジメ

163-1はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注6.6mg使用
163-2はday1にアロキシ注0.75mg、デカドロン注3.3mg、アロカリス注235mg使用

2022/5 アリムタからペトレキセドへ変更

登録年月日(適応追加)
2009 年 6 月 10 日

登録No.
No. 163