

診療科
内科、外科

疾患名
進行・再発大腸癌

レジメ名
FOLFOX4法＋セツキシマブ

投与間隔
1コース
2週間
計
コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日						
						day1	day2	day8				
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ² /day	div	2～4min	●	●					
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	600mg/m ² /day	civ	22hrs	●	●					
レボホリナート	レボホリナートNa	I-LV	100mg/m ² /day	div	2hrs	●	●					
オキサリプラチン	オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ² /day	div	2hrs	●						
①アービタックス	セツキシマブ		400mg/m ² /day	div	2hrs	●						
②アービタックス	セツキシマブ		250mg/m ² /day	div	1hr	(●)		●				

備 考

アービタックス： アービタックスは、1コース目のday1のみ①の投与量で実施する。以降は②の投与量で実施する。

主な副作用： 骨髄抑制、粘膜障害（口内炎、下痢）、嘔気、嘔吐、肝障害、腎障害、皮膚障害、アレルギー、ショック、末梢神経障害等
間質性肺疾患の既往歴、心疾患又はその既往歴のある患者は慎重投与。

登録年月日
2010 年 9 月 9 日

登録No.
No. 222