

診療科
外科、内科

疾患名
進行・再発大腸癌

レジメ名
FOLFIRI+セツキシマブ

投与間隔
1コース 2週間 計 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日					
						day1	day2	day8			
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ² /day	div	2~4min	●					
5-FU	フルオロウラシル	5-FU	2400~3000mg/m ² /クール	civ	46hrs	●	→				
レボホリナート	レボホリナートNa	l-LV	200mg/m ² /day	div	2hrs	●					
イリノテカン	イリノテカン	CPT-11	150~180mg/m ² /day	div	2hrs	●					
①アービタックス	セツキシマブ		400mg/m ² /day	div	2hrs	●					
②アービタックス	セツキシマブ		250mg/m ² /day	div	1hr	(●)		●			

備考

アービタックス： アービタックスは、1コース目のday1のみ①の投与量で実施する。以降は②の投与量で実施する。

主な副作用： 骨髄抑制、粘膜障害(口内炎、下痢)、嘔気、嘔吐、肝障害、腎障害、皮膚障害、アレルギー、ショック等
間質性肺疾患の既往歴、心疾患又はその既往歴のある患者は慎重投与。

day1にグラニセトロン注3mg、デカドロン注9.9mg使用 day8デカドロン注6.6mg使用

登録年月日
2010年9月9日

登録No.
No. 223