

診療科
内科、外科

疾患名
進行・再発大腸癌

レジメ名
FOLFOX4法＋パニツムマブ

投与間隔
1コース
2週間
計
コース

| 商品名 | 一般名 | 略号 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | | | | | |
|----------|-----------|-------|---------------------------|------|--------|------|------|--|--|--|--|
| | | | | | | day1 | day2 | | | | |
| 5-FU | フルオロウラシル | 5-FU | 400mg/m ² /day | div | 2~4min | ● | ● | | | | |
| 5-FU | フルオロウラシル | 5-FU | 600mg/m ² /day | civ | 22hrs | ● | ● | | | | |
| レボホリナート | レボホリナートNa | l-LV | 100mg/m ² /day | div | 2hrs | ● | ● | | | | |
| オキサリプラチン | オキサリプラチン | L-OHP | 85mg/m ² /day | div | 2hrs | ● | | | | | |
| ベクティビックス | パニツムマブ | | 6mg/Kg/day | div | 1hr | ● | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

備考

主な副作用：
骨髄抑制、粘膜障害（口内炎、下痢）、嘔気、嘔吐、肝障害、腎障害、皮膚障害、アレルギー、ショック、末梢神経障害等
間質性肺疾患の既往歴、心疾患又はその既往歴のある患者は慎重投与。

day1、2にグラニセトン注3mg、デカドロン注6.6mg使用

登録年月日
2010年9月9日

登録No.
No. 224