

診療科
血液内科

疾患名
バーキットリンパ腫

レジメ名
CODOX-M(レジメンA)

投与間隔
1コース 週間 計 2～3 コース

商品名	一般名	略号	投与量	投与方法	投与時間	投与日								
						day1	day2	day3	day4	day5	day8	day10	day15	day17
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	800mg/m ² /day	div	2hrs	●								
エンドキサン	シクロホスファミド	CPA	200mg/m ² /day	div	2hrs		●	●	●	●				
オンコビン	ビンクリスチン	VCR	1.5mg/m ² /day	div	30min	●					●		(●)	
ドキソルビシン	ドキソルビシン	ADM	40mg/m ² /day	div	30min	●								
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	536mg/m ² /day①	div	1hr							●		
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	107mg/m ² /h②	div	next 23hrs							●		
キロサイド	シタラビン	Ara-C	40mg/body/day③	i.t		●		●		(●)				
メソトレキセート	メソトレキサート	MTX	15mg/body/day③	i.t									●	(●)

備 考

- ・IVACとの交替療法では2コース、単独では3コースを実施。
- ・NSAIDs使用例、胸腹水、心のう水大量貯留例では、IVACをCODOX-MIに先行する。(A→B→A→Bではなく、B→A→B→Aとする)

登録年月日
2012 年 1 月 20 日

登録No.
No. 266-1